

# POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA DEL COVID-19

**No todo el mundo experimenta los efectos secundarios de la misma manera.** Nuestros cuerpos tienen diversas respuestas para generar anticuerpos a lo largo del tiempo. A continuación se muestra una lista de POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS. Si usted NO SUFRE EFECTOS SECUNDARIOS, esa también es una respuesta inmunitaria normal en muchas personas y no es algo de lo que deba preocuparse.

<b>Reacciones en el lugar de la inyección</b> Una respuesta física normal al recibir una vacuna.	<b>Efectos secundarios generales</b> Signos normales de que su cuerpo está generando protección.	<b>Reacción alérgica grave</b> Las reacciones alérgicas graves son raras. Preste atención a los siguientes signos.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor</li> <li>• Sensibilidad o hinchazón en la axila del brazo inyectado</li> <li>• Hinchazón (durezas)</li> <li>• Enrojecimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatiga</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Diarrea</li> <li>• Dolor muscular</li> <li>• Dolor en las articulaciones</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Náusea and vómitos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Hinchazón de la cara y garganta</li> <li>• Taquicardias</li> <li>• Sarpullido en todo el cuerpo</li> <li>• Mareos y debilidad</li> </ul>
<b>Cronograma de la aparición de posibles efectos secundarios:</b>		
Por lo general, aparecerán en los primeros 3 días tras la inyección.	Por lo general, aparecerán en los primeros 3 días tras la inyección.	Comenzarán en un periodo de entre unos minutos y 1 hora tras la inyección.
<b>¿Qué hacer si sufre efectos secundarios?:</b>		
Aplique una compresa fría. Debería resolverse a los pocos días.	Paracetamol/Tylenol Descanse y tome líquidos. Debería resolverse en 72 horas.	<b>Llame al 911 o acuda al hospital más cercano.</b>

## CUÍDESE Y RECUERDE:

- Si experimenta una reacción alérgica grave, llame al 911 o vaya al hospital más cercano.
- Llame a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que dure más de 72 horas.
- Para el dolor puede tomar acetaminofén (Tylenol), pero no ibuprofeno o naproxeno.
- Informe de los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas del FDA/CDC. El número de teléfono gratuito del VAERS es el: **1-800-822-7967** o informe en línea en: <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>

**¡GRACIAS POR PONER SU GRANITO DE ARENA!**